

水稲 トビイロウンカの注意報「第2号」が発表されました

奈良県農業協同組合

奈良県病害虫防除所より、令和3年5月26日に引き続き、6月28日に水稲トビイロウンカ（秋ウンカ）の注意報「第2号」が発表されました。

対象地域は奈良県全域、発生時期は早く、発生量は多いとされています。

これをうけて、7月の本田防除についてとりまとめましたので、参考のうえ対応をお願いします。

なお、8月以降の防除については、7月の誘殺状況を踏まえて情報を提供いたします。



トビイロウンカの成虫



坪枯れ



反枯れ

▶中山間地域（5月田植え）

田植え時にトリフルメゾピリムを含む箱施用剤（フルスロツトル粒剤、スクラム粒剤、ブーンゼクテラ粒剤等）を使用されていない方には6月中旬の本田防除をお願いしました。7月中旬（出穂前）には、どの箱施用剤を使用したかにかかわらず、下記のいずれかの薬剤により防除を行ってください。乳剤や粉剤で防除される方はJAにご相談下さい。

▶平坦地域（6月田植え）

田植え時にトリフルメゾピリムを含む箱施用剤（フルスロツトル粒剤、スクラム粒剤、ブーンゼクテラ粒剤等）を使用されていない方は、7月中旬に下記のいずれかの薬剤により必ず防除を行ってください。

7月の本田防除薬剤

| 防除薬剤名 | 使用量 (10aあたり) | 使用時期・ 使用回数 | 規格 | 農家渡し価格 (円/税込み) | 備考 |
|------------------------|-----------------|---------------------------|------|-------------------|----------------------------|
| スタークル粒剤 | 3kg | 収穫7日前まで・ 3回 | 3kg | 3,366 | ニカメイチュウ・ツマグロヨコバイ・イトヨリム同時防除 |
| スタークル豆つぶ | 250~500g | 収穫7日前まで・ 3回 | 250g | 3,630 | ツマグロヨコバイ同時防除 |
| ゴウケツモンスター粒剤 (中山間向け) | 3kg | 出穂5日まで（但し 収穫45日前まで）・1回 | 3kg | 5,830 | いもち病・紋枯病・カラムシ類同時防除 |
| トレボン粒剤（平坦のみ） | 2~3kg | 収穫21日前まで・ 3回 | 2kg | 1,760 | イトヨリム・ニカメイチュウ同時防除 |

※くわしくは、お近くのJAならけん営農経済センターまで

(令和3年6月29日作成)